



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 7222

Podpisany przez:
Elzbieta Zabicka-Lakomy
Data: 14.11.2022 13:54:53



ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

z dnia 7 listopada 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski PLH240034

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 6 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski PLH240034 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 2051, z późn. zm.), załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

Załącznik do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

z dnia 7 listopada 2022 r.

Cele działań ochronnych

Lp.	Przedmiot ochrony	Parametr / wskaźnik stanu ochrony	Cele działań ochronnych
1.	9110 kwaśne buczyny <i>Luzulo-Fagenion</i>	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska na co najmniej 85,50 ha (FV) z uwzględnieniem naturalnych procesów.
		Struktura i funkcje / charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika: charakterystyczna kombinacja florystyczna na poziomie FV – jest ona typowa dla siedliska przyrodniczego z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i zróżnicowania fitosocjologicznego w skali całego obszaru (1 stanowisko).
		Struktura i funkcje / skład drzewostanu	Poprawa oceny wskaźnika: skład drzewostanu z poziomu U1 – drzewostan o zaburzonych stosunkach ilościowych, jednak z udziałem gatunków mogących występować w siedlisku (sosna/brzoza/grab) do poziomu FV – drzewostan jedno- lub wielogatunkowy z dominującym udziałem buka (powyżej 50%) bez obecności gatunków obcych ekologicznie i/lub geograficznie w skali całego obszaru (1 stanowisko).
		Struktura i funkcje / inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie	Utrzymanie oceny wskaźnika: inwazyjne gatunki w podszycie i runie na poziomie FV – brak gatunków obcych o charakterze inwazyjnym w podszycie i w runie w skali całego obszaru (1 stanowisko).
		Struktura i funkcje / ekspansywne gatunki rodzime w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika: ekspansywne gatunki rodzime w runie na poziomie FV – brak gatunków ekspansywnych, lub pojedyncze okazy gatunków nitrofilnych w runie w skali całego obszaru (1 stanowisko).
		Struktura i funkcje / struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Poprawa oceny wskaźnika: struktura pionowa i przestrzenna roślinności z poziomu U1 – jest ona antropogenicznie zmieniona, stanowi jednolity drzewostan z pojedynczymi drzewami w innym wieku o jednakowym przestrzennie zwarcu, do poziomu FV – zróżnicowana, drzewostan różnowiekowy o zróżnicowanym przestrzennie zwarcu, z grupami i kępami starych drzew w skali całego obszaru (1 stanowisko).
		Struktura i funkcje / wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Utrzymanie oceny wskaźnika: wiek drzewostanu na poziomie FV – udział powyżej 10% drzew starszych niż 100 lat w skali całego obszaru (1 stanowisko).
		Struktura i funkcje / naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika: naturalne odnowienie drzewostanu na poziomie FV - odnowienia naturalne są obfite, reagują na luki i są zgodne z siedliskiem i nie wymagają uzupełniania odnowieniem sztucznym w skali całego obszaru (1 stanowisko).

		Struktura i funkcje / gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika: gatunki obce w drzewostanie na poziomie FV – poniżej 5% udziału powierzchniowego tj. najwyżej miejscami i nie odnawiające się w skali całego obszaru (1 stanowisko).
		Struktura i funkcje / martwe drewno (łącznie zasoby)	Poprawa oceny wskaźnika: martwe drewno – łączne zasoby z ilości poniżej 10 m ³ (U2) do poziomu pomiędzy 10 m ³ a 20 m ³ drzew/ha (U1) w skali całego obszaru (1 stanowisko). Osiągnięcie celu z uwagi na długotrwały proces formowania/inicjowania zasobów martwego drewna może wykraczać poza okres obowiązywania planu zadań ochronnych.
		Struktura i funkcje / martwe drewno wielkowymiarowe	Poprawa oceny wskaźnika: martwe drewno wielkowymiarowe z ilości poniżej 3 drzew/ha (U2) do poziomu pomiędzy 3 a 5 drzew/ha (U1) w skali całego obszaru (1 stanowisko). Osiągnięcie celu z uwagi na długotrwały proces formowania/inicjowania zasobów martwego drewna może wykraczać poza okres obowiązywania planu zadań ochronnych.
		Struktura i funkcje / drzewa mikrosiedliskowe (biocenotyczne)	Poprawa oceny wskaźnika: drzewa mikrosiedliskowe (biocenotyczne) z poziomu 10-20 szt. drzew biocenotycznych /ha (U1) do poziomu powyżej 20 szt. drzew biocenotycznych/ha (FV) w skali całego obszaru (1 stanowisko).
		Struktura i funkcje / Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskiwaniem drewna	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV - brak zniszczeń runa i gleby związanych z pozyskaniem drewna oraz innych zniekształceń (FV) w skali całego obszaru (1 stanowisko).
2.	9130 żyzne buczyny <i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska na co najmniej 71,92 ha (FV), z uwzględnieniem naturalnych procesów.
		Struktura i funkcje / charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika: charakterystyczna kombinacja florystyczna na poziomie FV – jest typowa, właściwa dla siedliska przyrodniczego w regionie, drzewostan bukowy, a w runie występuje m.in. przytulia wonna <i>Galium odoratum</i> , na wszystkich (dwóch) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / skład drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV skład drzewostanu – gatunki obce ekologicznie buczynom stanowią mniej niż 15% drzewostanu. Drzewostan zdominowany (powyżej 50%) przez gatunki buczynowe na wszystkich (dwóch) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika: ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie na poziomie FV – brak gatunków ekspansywnych w runie, lub dopuszczalne pojedyncze gatunki nitrofilne w runie, na wszystkich (dwóch) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika: struktura pionowej i przestrzennej roślinności na poziomie U1 – jednolity drzewostan z pojedynczymi drzewami w innym wieku, o jednakowym przestrzennie zwarcu na wszystkich (dwóch) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / wiek drzewostanu	Poprawa oceny wskaźnika: wiek drzewostanu z poziomu <10% udziału drzew starszych niż 100 lat , ale >50% drzew starszych niż 50 lat (U1) do poziomu >10% udziału drzew starszych niż 100 lat (FV) na wszystkich (dwóch) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika: naturalne odnowienie drzewostanu na poziomie FV – odnowienia są obfite, reagują na luki i są zgodne z siedliskiem, na wszystkich (dwóch) stanowiskach.

		Struktura i funkcje / gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika: inwazyjne gatunki obce w drzewostanie na poziomie FV – brak gatunków obcych lub poniżej 5% tj. najwyżej miejscami lub pojedynczo, nieodnawiające się, na wszystkich (dwóch) stanowiskach .
		Struktura i funkcje / inwazyjne gatunki obce w podszycie i w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika: inwazyjne gatunki obce do poziomu FV - brak gatunków inwazyjnych w podszycie i w runie na wszystkich (dwóch) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / martwe drewno (zasoby łączne)	Poprawa oceny wskaźnika: martwe drewno – łączne zasoby z ilości 10-20 m ³ /ha (U1) do poziomu powyżej 20 m ³ drzew/ha (FV) na wszystkich (dwóch) stanowiskach. Osiągnięcie celu z uwagi na długotrwały proces formowania/inicjowania zasobów martwego drewna może wykraczać poza okres obowiązywania planu zadań ochronnych.
		Struktura i funkcje / martwe drewno wielkowymiarowe	Poprawa oceny wskaźnika: martwe drewno wielkowymiarowe z ilości poniżej 3 drzew/ha (U2) do poziomu pomiędzy 3 a 5 drzew/ha (U1) na wszystkich (dwóch) stanowiskach. Osiągnięcie celu z uwagi na długotrwały proces formowania/ inicjowania zasobów martwego drewna może wykraczać poza okres obowiązywania planu zadań ochronnych .
		Struktura i funkcje / mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne)	Utrzymanie oceny wskaźnika: mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) na poziomie FV - powyżej 20 szt. drzew biocenotycznych/ha na wszystkich (dwóch) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskiwaniem drewna	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV - brak zniszczeń runa i gleby związanych z pozyskaniem drewna na wszystkich (dwóch) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV – stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska – stan siedliska wszystkich lokalnych gatunków jest właściwy dla stanowiska Huta Szklana 1. Na tym stanowisku występują duże populacje gnieźnika leśnego <i>Neottia nidus-avis</i> .
3.	9150 ciepłolubne buczyny storczykowe <i>Cephalanthero- Fagenion</i>	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska na co najmniej 86,49 ha (FV), z uwzględnieniem naturalnych procesów.
		Struktura i funkcje / gatunki charakterystyczne	Utrzymanie oceny wskaźnika liczba gatunków charakterystycznych na poziomie FV – powyżej 10 gatunków charakterystycznych m.in. przytulinka wiosenna, na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / gatunki ciepłolubne	Utrzymanie oceny wskaźnika: gatunki ciepłolubne na poziomie FV – 10 i więcej gatunków ciepłolubnych na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / gatunki nawapienne	Utrzymanie oceny wskaźnika: gatunki nawapienne na poziomie FV – 10 i więcej gatunków nawapiennych na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / naturalne odnowienie	Utrzymanie oceny wskaźnika: naturalne odnowienie na poziomie FV – jest obecne, ale nie dominujące runa (dopuszczalny miejscowy znaczny rozwój odnowienia w lukach drzewostanu) na stanowisku Huta Szklana

			2. Poprawa oceny wskaźnika: naturalne odnowienie z poziomu U1 – odnowienie bukowe dominujące runo siedliska, do poziomu FV na stanowiskach Sierbowice 2 i Las Niwiski.
		Struktura i funkcje / obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie oceny wskaźnika: obce gatunki inwazyjne na poziomie FV – brak inwazyjnych gatunków obcych na stanowisku Las Niwiski. Poprawa oceny wskaźnika: obce gatunki inwazyjne z poziomu U1 – jeden gatunek obcy (niecierpek drobnokwiatowy <i>Impatiens parviflora</i>) lub pokrycie do 5%, do poziomu FV dla stanowisk Huta Szklana 2 i Sierbowice 2.
		Struktura i funkcje / pokrycie przez gatunki traw	Utrzymanie oceny wskaźnika: pokrycie przez gatunki traw na poziomie FV – bardzo niskie pokrycie trawami, poniżej 30%, na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / struktura przestrzenna płatów siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika: struktura przestrzenna płatów siedliska na poziomie FV - płat jednolity lub wyjątkowo rozdzielony, obejmujący powyżej 60% siedliska, na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika: udział gatunków dominujących na poziomie FV - dominują typowe gatunki leśne, pokrycie gatunków charakterystycznych przynajmniej 20% na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / cenne składniki flory	Utrzymanie oceny wskaźnika: cenne składniki flory na poziomie FV – powyżej 3 cennych gatunków na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika: obecność gatunków obcych ekologicznie w drzewostanie na poziomie FV – do 5% gatunków (brak w drzewostanie gatunków obcych) na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Struktura i funkcje / struktura drzewostanu na stanowisku	Poprawa oceny wskaźnika: struktura drzewostanu z poziomu U1 - antropogenicznie zmieniona struktura drzewostanu do poziomu FV – naturalna i zróżnicowana struktura na wszystkich (trzech) stanowiskach.
4.	1902 obuwik pospolity <i>Cypripedium calceolus</i>	Stan populacji / typ rozmieszczenia	Utrzymanie oceny wskaźnika: typ rozmieszczenia na poziomie FV – skupienia po kilkadziesiąt pędów na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Stan populacji / liczba pędów generatywnych	Utrzymanie oceny wskaźnika: liczba pędów generatywnych na poziomie FV – powyżej 30% wszystkich pędów na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Stan populacji / liczba pędów wegetatywnych	Utrzymanie oceny wskaźnika: na poziomie FV – poniżej 70% wszystkich pędów na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Stan populacji / efektywność zapylania	Utrzymanie oceny wskaźnika: efektywność zapylania na poziomie FV – powyżej 30% zawiązanych nasion na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Stan populacji/ obecność siewek	Utrzymanie oceny wskaźnika: obecność siewek na poziomie FV – więcej niż pojedyncze siewki na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Stan populacji / stan zdrowotny	Utrzymanie oceny wskaźnika: stan zdrowotny na poziomie FV brak oznak złego stanu zdrowotnego na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Stan siedliska / fragmentacja siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika: fragmentacja siedliska na poziomie FV – mała fragmentacja siedliska na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Stan siedliska / ocienienie	Poprawa oceny wskaźnika: ocienienie przez drzewa i krzewy z poziomu od 40 do 70% (U1) do poziomu od

		przez drzewa i krzewy	25% do 40% (FV) – na stanowiskach: Obuwiki w Lesie Niwiskim i Huta Szklana; oraz z poziomu powyżej 70% (U2) do poziomu U1 na stanowisku Sierbowice.
		Stan siedliska / wysokie byliny/ gatunki ekspansywne/ konkurencyjne	Utrzymanie oceny wskaźnika: obecność wysokich bylin i gatunków ekspansywnych/ konkurencyjnych na poziomie FV – brak takich roślin lub poniżej 20% na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Stan siedliska / wysokość runi	Utrzymanie oceny wskaźnika: wysokość runi na poziomie FV – średnio poniżej 40 cm na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Stan siedliska / wojłok (martwa materia organiczna)	Utrzymanie oceny wskaźnika: wojłok (martwa materia organiczna) na poziomie FV – głębokość poniżej 3 cm na wszystkich (trzech) stanowiskach .
		Stan siedliska / miejsce do kiełkowania	Utrzymanie oceny wskaźnika: miejsce do kiełkowania na poziomie FV – powyżej 5% na wszystkich (trzech) stanowiskach.
		Stan siedliska / negatywne wpływy z otoczenia	Utrzymanie oceny wskaźnika: negatywne wpływy z otoczenia na poziomie FV – brak takich wpływów na wszystkich (trzech) stanowiskach.