



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lipca 2023 r.

Poz. 5648

Elektronicznie podpisany przez:

Elżbieta Żabicka-Lakomy

Data: 12.07.2023 08:19:18



ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

z dnia 5 lipca 2023 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki
Dąbrowskie PLH240041**

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375),

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Dąbrowskie PLH240041 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 7831) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

Załącznik do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 5 lipca 2023 r.**Cele działań ochronnych**

Lp.	Przedmiot ochrony	Parametr/ Wskaźnik ¹⁾	Cele działań ochronnych ²⁾
1.	6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	Powierzchnia siedliska	Zachowanie siedliska na powierzchni 45,9 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów, w warunkach dominacji powierzchniowej źle zachowanych płatów (stan U2).
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko	Zachowanie stabilnej, niepofragmentowanej i właściwej struktury przestrzennej płatów siedliska w obszarze (stan FV). Siedlisko zajmuje 80-100% powierzchni areału, na którym zostało wyznaczone.
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	Utrzymanie siedliska w średnim stopniu fragmentacji (U1) na łącznej powierzchni 2,72 ha. Na pozostałej powierzchni zachowanie siedliska przyrodniczego w stanie co najmniej nie pogorszone (U2) w obrębie istniejącej mozaiki roślinności – duży stopień fragmentacji.
		Gatunki typowe	Zachowanie w płatach siedliska minimum pięciu gatunków charakterystycznych i minimum trzech wyróżniających dla związku <i>Molinion</i> (stan właściwy FV).
		Gatunki dominujące	Zachowanie istniejącej struktury gatunkowej tj. w płatach siedliska współpanują gatunki charakterystyczne dla klasy <i>Molinio-Arrhenatheretea</i> , w szczególności gatunki typowe dla siedliska (stan właściwy FV).
		Obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie siedliska w stanie nie pogorszone (U1) tj. dopuszcza się występowanie gatunków inwazyjnych w płatach siedlisk m.in. nawłoci pod warunkiem, że ich pokrycie nie będzie przekraczać 5%.
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	Utrzymanie siedliska w stanie właściwym (FV) na powierzchni 2,72 ha, czyli przy niewielkim udziale gatunków ekspansywnych (<10%) oraz w stanie niezadawalającym (U1) na pozostałej powierzchni, gdzie dopuszcza się występowanie gatunków ekspansywnych o pokryciu do 30%.
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	Poprawa oceny wskaźnika na łącznej powierzchni 43,2 ha, aż do osiągnięcia stanu właściwego (FV) tj. łączne pokrycie drzew i krzewów w obrębie płatów siedliska nie będzie przekraczać 5%, natomiast na pozostałej powierzchni 2,72 ha utrzymanie oceny tego wskaźnika na tym poziomie.
2.	6177 Modraszek telejus	Wojłok (martwa materia organiczna)	Poprawa oceny wskaźnika, aż do osiągnięcia stanu właściwego (FV) tj. grubość warstwy wojłoku nie będzie przekraczać 2 cm.
		Populacja	Utrzymanie istniejącej populacji gatunku w obszarze, szacowanej na ok. 229-500 osobników (stan U2).
		Powierzchnia	Zachowanie łąk stanowiących siedlisko gatunku na powierzchni ok. 115

¹⁾ Parametry/wskaźniki stanu ochrony, zostały oparte na podstawie wskaźników stanu zachowania zawartych w metodyce monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a także raportów, o których mowa w art. 38 tej ustawy.

²⁾ Wartości parametrów i wskaźników określone zostały w trójstopniowej skali FV (stan właściwy), U1 (stan niezadawalający), U2 (stan zły) zgodnie z metodyką stosowaną w ramach państwowego monitoringu środowiska, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

	<i>Maculinea (Phengaris) teleius</i>		ha (stan FV).
		Dostępność roślin żywicielskich	Zachowanie stanowisk roślin żywicielskich w obrębie siedliska gatunku. Udział krwiściagu lekarskiego w płacie siedliska powinien przekraczać 20% (stan właściwy FV) na 4 stanowiskach oraz osiągać 5-20% udziału na pozostałych 5 stanowiskach (stan niezadawalający U1).
		Dostępność mrówek gospodarzy	Utrzymanie populacji mrówek z rodzaju wścieklica, penetrujących przeciętnie 20 - 50% siedlisk modraszka na 8 stanowiskach (stan niezadawalający U1) oraz obrębie 1 stanowiska penetrujących przeciętnie > 50 % siedliska modraszka (stan właściwy FV).
		Zarastanie ekspansywnymi bylinami	Poprawa oceny wskaźnika do stanu właściwego (FV) na 2 stanowiskach tj. udział powierzchni zajętej przez ekspansywne byliny nie powinien przekraczać 25% powierzchni siedlisk gatunku. Utrzymanie obecnej oceny wskaźnika na poziomie właściwym FV na pozostałych 7 stanowiskach.
		Zarastanie przez drzewa/krzewy	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV tj. udział powierzchni zajętej przez drzewa i krzewy nie powinien przekraczać 25% powierzchni siedliska gatunku na wszystkich 9 stanowiskach.
3.	6179 Modraszek nausitous <i>Maculinea (Phengaris) nausithous</i>	Populacja	Utrzymanie istniejącej populacji gatunku w obszarze, szacowanej na ok. 188-500 osobników (stan U2).
		Powierzchnia	Zachowanie łąk stanowiących siedlisko gatunku na powierzchni ok 115 ha (FV).
		Dostępność roślin żywicielskich	Zachowanie stanowisk roślin żywicielskich w obrębie siedliska gatunku. Udział krwiściagu lekarskiego w płacie siedliska powinien przekraczać 20% (stan właściwy FV) na 4 stanowiskach oraz osiągać 5-20% na pozostałych 5 stanowiskach (stan niezadawalający U1).
		Dostępność mrówek gospodarzy	Utrzymanie populacji mrówek (wścieklicy zwyczajnej), penetrujących przeciętnie 20-50% powierzchni siedlisk modraszka na 8 stanowiskach (stan niezadawalający U1) oraz obrębie 1 stanowiska penetrujących przeciętnie > 50% siedliska modraszka (stan właściwy FV).
		Zarastanie ekspansywnymi bylinami	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV) tj. udział powierzchni zajętej przez ekspansywne byliny nie powinien przekraczać 25% powierzchni siedlisk gatunku na 7 stanowiskach. Poprawa oceny wskaźnika do stanu właściwego FV na 2 stanowiskach.
		Zarastanie przez drzewa/krzewy	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV tj. udział powierzchni zajętej przez drzewa i krzewy nie powinien przekraczać 25% powierzchni siedlisk gatunku na wszystkich 9 stanowiskach.